

第 469 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审查,批准硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂生产的马来酸奥拉替尼片在我国注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂等 3 家公司生产的复方非泼罗尼吡喹酮滴剂等 3 种兽药产品在我国再注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布修订后的产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。此前发布的该产品质量标准、说明书和标签同时废止。

批准保加利亚标伟特股份有限公司生产的延胡索酸泰妙菌素预混剂在我国变更注册,发布修订后的产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。此前发布的该产品质量标准、说明书和标签同时废止。

特此公告。

附件:1. 进口兽药注册目录

2. 质量标准

3. 说明书和标签

农业农村部

2021年9月6日

附件 1

进口兽药注册目录

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药注册证书号	有效期限	备注
马来酸奥拉替尼片 (3.6mg) Oclacitinib Maleate Tablets	硕腾公司美国卡拉玛祖 生产厂 Zoetis LLC Kalamazoo, USA	美国	(2021) 外兽药证字 51号	2021.09.06 — 2026.09.05	注册
马来酸奥拉替尼片 (5.4mg) Oclacitinib Maleate Tablets			(2021) 外兽药证字 52号		
马来酸奥拉替尼片 (16mg) Oclacitinib Maleate Tablets			(2021) 外兽药证字 53号		

<p>复方非泼罗尼吡喹酮滴剂 (0.3ml/管) Compound Fipronil and Praziquantel Spot-on Solution</p>	<p>勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂</p>	<p>法国</p>	<p>(2021) 外兽药证字 54号</p>	<p>2021.09.06 — 2026.09.05</p>	<p>再注册</p>
<p>复方非泼罗尼吡喹酮滴剂 (0.9ml/管) Compound Fipronil and Praziquantel Spot-on Solution</p>	<p>Boehringer Ingelheim Animal Health France</p>	<p>法国</p>	<p>(2021) 外兽药证字 55号</p>	<p>2021.09.06 — 2026.09.05</p>	<p>再注册</p>
<p>猪萎缩性鼻炎灭活疫苗 Swine Atrophic Rhinitis Vaccine, Inactivated</p>	<p>西班牙海博莱生物大药厂 LABORATORIOS HIPRA, S.A.</p>	<p>西班牙</p>	<p>(2021) 外兽药证字 56号</p>	<p>2021.09.06 — 2026.09.05</p>	<p>再注册</p>

<p>盐酸土霉素注射液 Oxytetracycline Hydrochloride Injection</p>	<p>英特威国际 有限公司德 国厂 Intervet International GmbH</p>	<p>德国</p>	<p>(2021) 外兽药证字 57号</p>	<p>2021.09.06 — 2026.09.05</p>	<p>再注册</p>
<p>延胡索酸泰妙菌素 预混剂 Tiamulin Fumarate Premix</p>	<p>保加利亚标 伟特股份有 限公司 BIOVET Joint Stock Company</p>	<p>保加 利亚</p>	<p>(2017) 外兽药证字 22号</p>	<p>2017.03.31 — 2022.03.30</p>	<p>变更注册：增加 靶动物鸡</p>

附件 2 略

附件 3

马来酸奥拉替尼片等 5 种兽药产品说明书和标签

一、马来酸奥拉替尼片说明书和标签

(一) 马来酸奥拉替尼片说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称：马来酸奥拉替尼片

商品名称：爱波克[®]（Apoquel[®]）

英文名称：Oclacitinib Maleate Tablets

汉语拼音：Malaisuan Aolatini Pian

【主要成分】 马来酸奥拉替尼。

【性状】 本品为薄膜衣刻痕片，除去包衣后呈白色或类白色。

【药理作用】 奥拉替尼是一种合成的细胞内非受体酪氨酸激酶（JAK）抑制剂，通过抑制多种依赖于JAK1、JAK3酶活性诱发的瘙痒、炎症细胞因子以及其他与过敏有关的细胞因子起作用。本品对与依赖于JAK2的造血有关的细胞因子没有影响。犬内服给药后，药物吸收迅速、良好。食物对吸收率或吸收程度无显著影响。静脉注射和内服给药的消除半衰期相似，绝对生物利用度为89%，血浆蛋白结合率为66.3%~69.7%。本品在犬体内代谢为多种代谢物，在血浆和尿液中可检测到一种主要氧化代谢物。本品主要经代谢清除，部分通过肾脏和胆汁排泄。本品为非皮质类固醇或抗组胺药的免疫调节剂。

【适应证】 用于控制犬过敏性皮炎引起的瘙痒症和特应性皮炎。

【用法与用量】 以奥拉替尼计。内服：每1kg体重，犬0.4 mg~0.6mg，一日2次，连用14日。随后一日1次维持治疗。

推荐给药剂量表：

体重范围 (kg)	剂量 (片)		
	3.6mg/片	5.4mg/片	16mg/片
3.0~4.4	0.5	-	-
4.5~5.9	-	0.5	-
6.0~8.9	1	-	-
9.0~13.4	-	1	-
13.5~19.9	-	-	0.5
20.0~26.9	-	2	-
27.0~39.9	-	-	1
40.0~54.9	-	-	1.5
55.0~80.0	-	-	2

【不良反应】 1.可能增加犬对感染（包括蠕形螨病）的敏感性，以及肿瘤恶化。

2.可能会发生腹泻（2.3%）、呕吐（2.3%）、厌食（1.4%）、嗜睡（1.8%）、多饮（1.4%）等症状，大多数病例继续用药后症状可自行缓解。

【注意事项】 1.12月龄以下或体重低于3kg的犬不得使用；育种用犬、怀孕或哺乳母犬不得使用；严重感染（如肺炎等系统性感染或全身真菌性感染）的犬不得使用。

2.伴有复发的严重感染、复发性蠕形螨病、肿瘤病史的犬使用本品前，应充分评估风险。

3.本品对免疫系统具有调节作用。

4. 应注意监测使用本品犬的感染（包括蠕形螨）和肿瘤进展情况。
5. 可以伴食给药或空腹给药。
6. 尚未评价本品与糖皮质激素、环孢菌素或其他全身用免疫抑制剂的联合用药情况。
7. 使用人员在处理药片后，立即洗手。如眼睛接触到药物，立即用水或生理盐水冲洗至少15分钟，随后就医。
8. 避免儿童接触本品。
9. 本品仅供犬使用。一旦发生人意外吞食，必须立刻就医并告知医生相关情况。

【休药期】 无需制定。

【规格】 按 $C_{15}H_{23}N_5O_2S$ 计 (1) 3.6mg (2) 5.4mg (1) 16mg

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【有效期】 24个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂 (Zoetis LLC Kalamazoo, USA)

地址: 2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA

(二) 马来酸奥拉替尼片标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称: 马来酸奥拉替尼片

商品名称: 爱波克[®] (Apoquel[®])

英文名称: Oclacitinib Maleate Tablets

汉语拼音: Malaisuan Aolatini Pian

【主要成分】 马来酸奥拉替尼。

【性状】 本品为薄膜衣刻痕片，除去包衣后呈白色或类白色。

【适应证】 用于控制犬过敏性皮炎引起的瘙痒症和特应性皮炎。

【用法与用量】 以奥拉替尼计。内服: 每1kg体重，犬0.4 mg~0.6mg，一日2次，连用14日。随后一日1次维持治疗。

推荐给药剂量表:

体重范围 (kg)	剂量 (片)		
	3.6mg/片	5.4mg/片	16mg/片
3.0~4.4	0.5	-	-
4.5~5.9	-	0.5	-
6.0~8.9	1	-	-
9.0~13.4	-	1	-
13.5~19.9	-	-	0.5
20.0~26.9	-	2	-
27.0~39.9	-	-	1
40.0~54.9	-	-	1.5
55.0~80.0	-	-	2

【规格】 按 $C_{15}H_{23}N_5O_2S$ 计 (1) 3.6mg (2) 5.4mg (1) 16mg

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 密闭保存。

【包装】

【生产企业】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂（Zoetis LLC Kalamazoo, USA）

地址：2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA

二、复方非泼罗尼吡喹酮滴剂说明书和标签

（一）复方非泼罗尼吡喹酮滴剂说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称：复方非泼罗尼吡喹酮滴剂

商品名称：博来恩（Broadline）

英文名称：Compound Fipronil and Praziquantel Spot-on Solution

汉语拼音：Fufang Feipoluoni Bikuitong Diji

【主要成分】 非泼罗尼、甲氧普烯、乙酰氨基阿维菌素、吡喹酮。

【性状】 本品为无色至黄色或橙红色溶液。

【药理作用】 非泼罗尼是广谱杀虫药。与昆虫中枢神经细胞膜上的 γ -氨基丁酸（GABA）受体结合，关闭神经细胞的氯离子通道，从而干扰中枢神经系统的正常功能而导致昆虫死亡。主要通过胃毒和触杀起作用，也具有一定的内吸作用。

甲氧普烯是昆虫的生长调节剂（IGR），是昆虫保幼激素的同类物，对未成熟阶段昆虫的发育有抑制作用。这种药物与保幼激素的作用机制相类似，可导致昆虫发育受阻和发育阶段的跳蚤死亡。甲氧普烯对动物体上的卵的作用机制主要包括：通过直接渗透作用穿过卵壁进入新生跳蚤卵或者通过跳蚤成虫角质上皮的吸收而进入卵内。甲氧普烯对跳蚤幼虫和蛹的发育也有很强的抑制作用。

乙酰氨基阿维菌素对体内外寄生虫主要是体内线虫和节肢动物具有良好的驱杀作用。其驱虫作用机理在于促进触前神经元释放 γ -氨基丁酸（GABA），从而打开GABA介导的氯离子通道。乙酰氨基阿维菌素对无脊椎动物神经和肌肉细胞位于GABA介导点附近的谷氨酸介导的氯离子通道也具有选择性和高亲和力，从而干扰神经肌肉间的信号传递，使虫体松弛麻痹，导致虫体死亡或被排出体外。

吡喹酮具有广谱抗血吸虫和抗绦虫作用。对各种绦虫的成虫和幼虫具有良好的活性。吡喹酮对绦虫的准确作用机理尚未确定，但可能是与虫体包膜的磷脂相互作用，结果导致钠、钾离子流出。在体外低浓度的吡喹酮似可损伤绦虫的吸盘功能并兴奋虫体的蠕动，较高浓度药物则可增强绦虫链体（节片链）的收缩（在极高浓度时为不可逆转）。此外，吡喹酮可以引起绦虫包膜特殊部位形成灶性空泡，继而使虫体裂解。

【适应证】 用于预防和治疗猫跳蚤、蜱虫感染，治疗胃肠道线虫、绦虫感染，并可用作辅助治疗因跳蚤引起的过敏性皮炎。

【用法与用量】 外用：分开猫颈背部毛发，将给药器中的全部药量滴至皮肤一点。体重小于2.5kg的猫使用0.3ml滴管；体重为2.5kg~7.5kg的猫使用0.9ml滴管；体重7.5kg以上的猫可根据体重，将药管组合使用。每月给药一次。

【不良反应】 治疗后在用药部位可能发现一过性的毛发粘合和轻度一过性皮肤反应(瘙痒,脱毛),不经治疗可自行恢复。如果猫在治疗后舔舐给药部位或经口摄入可能导致唾液分泌、呕吐或一过性神经症状(如瞳孔扩大,共济失调,定向障碍,冷漠)。这些表现可在 24 小时内消失,无需治疗即可缓解。

【注意事项】

1. 不得用于犬、兔。禁用于患病(例如全身疾病、发热)或正在康复的动物。
2. 7 周龄以下和/或体重小于 0.6kg 的猫、妊娠期和哺乳期内的猫未进行安全性研究,慎用。
3. 滴于猫不易舔舐的颈背部皮肤,不应滴在毛发上以免影响疗效。
4. 治疗后待给药部位干燥再与动物接触。不建议动物在治疗后两日内洗澡,以免降低疗效。
5. 勿超剂量给药,重复用药间隔最短应 2 周以上。
6. 如果出现严重不良反应,应立即停止用药,并咨询兽医。
7. 使用本品时,使用者勿进食,喝水等。用药后及时用皂水洗手。
8. 未使用的药管应置于原外包装盒中,以便遮光;用完空管应妥善处理,勿弃于水塘,沟渠和河流内。
9. 本品应存放于儿童无法触及处。

【休药期】 不需要制定。

【规格】 (1) 0.3ml/管 (2) 0.9ml/管

每 1ml 含非泼罗尼 83mg、甲氧普烯 100mg、乙酰氨基阿维菌素 4mg、吡喹酮 83mg。

【包装】 (1) 1 管/盒 (2) 3 管/盒 (3) 4 管/盒 (4) 6 管/盒

【贮藏】 遮光,密封保存。

【有效期】 24 个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂 (Boehringer Ingelheim Animal Health France)

地址: 4 Chemin Du Calquet, 31000 Toulouse, FRANCE

(二) 复方非泼罗尼吡喹酮滴剂标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方非泼罗尼吡喹酮滴剂

商品名称: 博来恩 (Broadline)

英文名称: Compound Fipronil and Praziquantel Spot-on Solution

汉语拼音: Fufang Feipoluoni Bikuitong Diji

【主要成分】 非泼罗尼、甲氧普烯、乙酰氨基阿维菌素、吡喹酮。

【性状】 本品为无色至黄色或橙红色溶液。

【适应证】 用于预防和治疗猫跳蚤、蜱虫感染,治疗胃肠道线虫、绦虫感染,并可用作辅助治疗因跳蚤引起的过敏性皮炎。

【用法与用量】 外用: 分开猫颈背部毛发,将给药器中的全部药量滴至皮肤一点。体重小于 2.5kg 的猫使用 0.3ml 滴管; 体重为 2.5kg~7.5kg 的猫使用 0.9ml 滴管; 体重 7.5kg 以上的猫可根据体重,将药管组合使用。每月给药一次。

【规格】 (1) 0.3ml/管 (2) 0.9ml/管

每 1ml 含非泼罗尼 83mg、甲氧普烯 100mg、乙酰氨基阿维菌素 4mg、吡喹酮 83mg。

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】不需要制定。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】（1）1 管/盒 （2）3 管/盒 （3）4 管/盒 （4）6 管/盒

【生产企业】勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂（Boehringer Ingelheim Animal Health France）

地址：4 Chemin Du Calquet, 31000 Toulouse, FRANCE

三、猪萎缩性鼻炎灭活疫苗说明书和内包装标签

（一）猪萎缩性鼻炎灭活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 猪萎缩性鼻炎灭活疫苗

商品名 喜庆安

英文名 Swine Atrophic Rhinitis Vaccine, Inactivated

汉语拼音 Zhu Weisuoxingbiyan Miehuoyimiao

【主要成分与含量】含灭活的支气管败血波氏杆菌 833 株和 D 型多杀性巴氏杆菌 637 株坏死毒素的类毒素，灭活前支气管败血波氏杆菌 833 株活菌数应至少为 2×10^{10} 个/头份，D 型多杀性巴氏杆菌坏死毒素的类毒素至少为 5 μ g/头份。

【性状】白色均匀乳剂。

【作用与用途】用于预防猪萎缩性鼻炎。

【用法与用量】颈部深部肌肉注射。用于 6 月龄以上猪，每头每次接种 1 头份（2ml）。推荐采用下列接种程序：

初产母猪和青年公猪 在进入农场时进行首免，4~6 周后加强接种 1 次。然后根据农场中的免疫程序进行接种。

母猪和成年公猪 对所有经产母猪（怀孕和哺乳期的母猪）和所有种公猪接种疫苗 1 头份，间隔 4~6 周，进行第 2 次接种。在第 2 次接种 3 个月后，推荐对怀孕母猪再接种 1 次（在产前 30~40 日时进行）。对种公猪，每隔 6 个月接种 1 次。

【不良反应】个别敏感猪可能会发生过敏反应，应用抗组胺药进行治疗。

【注意事项】（1）仅用于接种健康猪。

（2）2℃~8℃下保存，避免冷冻。

（3）用前应充分摇匀，并放至室温（15℃~25℃）。

（4）疫苗开启后应一次性用完。

（5）接种时，应采取常规的无菌操作方法进行。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】（1）10 头份（20ml）/瓶 （2）50 头份（100ml）/瓶

【包装】 1 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA, S.A.）

地址 Avda. La Selva, 135. 17170—Amer(Girona) Spain

电话 0034972430660 传真 0034972430661

仅在兽医指导下使用

（二）猪萎缩性鼻炎灭活疫苗内包装标签

兽用

喜庆安

猪萎缩性鼻炎灭活疫苗

10（50）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

生产日期：

详见说明书。

【作用与用途】 用于预防猪萎缩性鼻炎。

【注意事项】 仅用于接种健康猪；2℃~8℃下保存，严禁冻结；用前应充分摇匀，并放至室温（15℃~25℃）；疫苗开启后应一次性用完；接种时，应采取常规的无菌操作方法进行；用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理；个别敏感猪可能会发生过敏反应，应用抗组胺药进行治疗。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 24 个月。

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA, S.A.）

仅在兽医指导下使用

四、盐酸土霉素注射液说明书和标签

（一）盐酸土霉素注射液说明书

兽用 处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸土霉素注射液

商品名称：安净霉素 10%（Engemycin 10%）

英文名称：Oxytetracycline Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Tumeisu Zhusheye

【主要成分】 盐酸土霉素

【性状】 本品为黄绿色澄明液体。

【药理作用】 四环素类抗生素。土霉素为广谱抗生素，对大部分革兰氏阳性和阴性菌有抗菌作用。土霉素通过抑制转移 RNA 核糖体的氨酰基的附着，干扰蛋白合成，抑制细菌细胞

代谢而呈抑菌和杀菌的作用。链球菌、葡萄球菌、梭菌、炭疽杆菌、巴氏杆菌、布氏杆菌、棒状杆菌、丹毒丝菌、嗜血杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌对其敏感，土霉素对因支原体、螺旋体、放线菌、立克次氏体、衣原体等感染引起的疾病也有治疗作用。

【适应证】用于治疗由敏感的革兰氏阳性和阴性菌、立克次氏体、支原体等引起的感染性疾病。

【用法与用量】以土霉素计。肌内注射：一次量，每 1kg 体重，猪 10mg~20mg。必要时 48 小时重复注射一次。

【不良反应】按推荐剂量使用，未见不良反应。

【注意事项】

1. 禁止使用于对土霉素过敏的动物。
2. 对土霉素敏感的操作人员在使用时避免与皮肤接触。

【休药期】猪 28 日。

【规格】100ml：10g

【包装】

【贮藏】遮光，15℃~25℃保存。

【有效期】24 个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】英特威国际有限公司德国厂（Intervet International GmbH）

地址：Feldstraße 1a, 85716 Unterschleißheim, Bavaria, Germany

（二）盐酸土霉素注射液标签

兽用 处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸土霉素注射液

商品名称：安净霉素 10%（Engemycin 10%）

英文名称：Oxytetracycline Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Tumeisu Zhushuye

【主要成分】盐酸土霉素

【性状】本品为黄绿色澄明液体。

【适应证】用于治疗由敏感的革兰氏阳性和阴性菌、立克次氏体、支原体等引起的感染性疾病。

【用法与用量】以土霉素计。肌内注射：一次量，每 1kg 体重，猪 10mg~20mg。必要时 48 小时重复注射一次。

【规格】100ml：10g

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】猪 28 日。

【贮藏】遮光，15℃~25℃保存。

【包装】

【生产企业】英特威国际有限公司德国厂（Intervet International GmbH）

地址：Feldstraße 1a, 85716 Unterschleißheim, Bavaria, Germany

五、延胡索酸泰妙菌素预混剂说明书和标签

(一) 延胡索酸泰妙菌素预混剂说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：延胡索酸泰妙菌素预混剂

商品名称：乐多丁（Rodotium[®]）

英文名称：Tiamulin Fumarate Premix

汉语拼音：Yanhusuosuan Taimiaojunsu Yuhunji

【主要成份】 延胡索酸泰妙菌素

【性状】 本品为白色或淡黄色颗粒。

【药理作用】 **药效学** 截短侧耳素类抗生素。泰妙菌素是一种二萜类抗生素截短侧耳素的半合成衍生物，主要对革兰氏阳性菌（葡萄球菌、链球菌、梭菌、放线杆菌、丹毒丝菌、李斯特氏菌）具有较强的抑制作用。泰妙菌素对革兰氏阴性菌（巴斯特氏菌、克雷白氏杆菌、嗜血杆菌、梭形杆菌、弯曲杆菌、拟杆菌）也有效；对支原体和螺旋体等也具有较强的抑制作用。

药动学 泰妙菌素能够被肠道快速吸收。药物吸收后在畜禽体内广泛分布，其最高浓度集中在肝脏和肺脏。泰妙菌素排泄速度很快，几乎全部以泰妙菌素代谢物的形式经胆汁和肾脏从尿液和粪便中排泄。

【适应证】 用于治疗猪支原体肺炎和猪放线杆菌胸膜性肺炎，也可用于猪密螺旋体引起的痢疾；用于防治由鸡毒支原体引起的鸡慢性呼吸道疾病。

【用法与用量】 以延胡索酸泰妙菌素计。混饲：每1000kg饲料，猪100g；连用5~10日；鸡500g，连用5日。

【不良反应】 本品用于猪时，按推荐剂量使用有时会出现皮肤红斑，过量使用可引起短暂流涎、呕吐和中枢神经抑制；用于鸡时，过量使用的急性毒性临床症状有发声、阵挛性痉挛和侧卧。

【注意事项】 1. 仅限于兽用。

2. 蛋鸡产蛋期不得使用。

3. 延胡索酸泰妙菌素不得与聚醚类抗生素合用。在给予延胡索酸泰妙菌素预混剂前、后7日以及服药期内，不得给予含有莫能菌素、盐霉素、马杜霉素、甲基盐霉素等成分的药物。

4. 本品不得用于怀孕及哺乳期动物。

5. 对泰妙菌素敏感度过高的人应避免接触本品。

6. 使用本品时操作者不得饮水、进食、吸烟，施药后应洗手。本品直接接触皮肤或黏膜可能有刺激性，应避免与眼睛及皮肤接触，如接触应立即用水冲洗。如意外吞食本品，应立即就医。

7. 置于儿童无法触及处。

【休药期】 猪7日；鸡3日。

【规格】 80%。

【包装】

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【有效期】 36个月。

【生产企业】 保加利亚标伟特股份有限公司（BIOVET Joint Stock Company）

地址：NO.39, Petar Rakov Street, Peshtera 4550, Bulgaria

（二）延胡索酸泰妙菌素预混剂标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：延胡索酸泰妙菌素预混剂

商品名称：乐多丁（Rodotium®）

英文名称：Tiamulin Fumarate Premix

汉语拼音：Yanhusuosuan Taimiaojunsu Yuhunji

【主要成份】 延胡索酸泰妙菌素

【性状】 本品为白色或淡黄色颗粒。

【适应证】 用于治疗猪支原体肺炎和猪放线杆菌胸膜性肺炎，也可用于猪密螺旋体引起的痢疾；用于防治由鸡毒支原体引起的鸡慢性呼吸道疾病。

【用法与用量】 以延胡索酸泰妙菌素计。混饲：每1000kg饲料，猪100g，连用5~10日；鸡500g，连用5日。

【规格】 80%。

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】至

【休药期】 猪7日；鸡3日。

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【包装】

【生产企业】 保加利亚标伟特股份有限公司（BIOVET Joint Stock Company）

地址：NO.39, Petar Rakov Street, Peshtera 4550, Bulgaria