

北京市药品监督管理局

北京市中药配方颗粒标准

BJ-PFKL-2022003

炒川楝子配方颗粒

Chaochuanlianzi Peifangkeli

【来源】 本品为楝科植物川楝 *Melia toosendan Sieb. et Zucc.* 的干燥成熟果实经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取炒川楝子饮片 3400g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 16%~29%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的颗粒；气微，味酸、苦。

【鉴别】 取本品 2g，研细，加水 30ml，超声处理 30 分钟，放冷，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取川楝子对照药材 2g，加水 50ml，煎煮 30 分钟，滤过，滤液浓缩至约 30ml，放冷，自“用乙酸乙酯振摇提取 2 次”起，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 3 μ l、对照药材溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（7:3:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为 250mm，内径为 4.6mm，粒径为 5 μ m）；以乙腈为流动相 A，以 0.1% 甲酸溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟 1.0ml；柱温为 30℃；蒸发光散射检测器检测。理论板数按川楝素峰计算应不低于 5000。

时间（分钟）	流动相A（%）	流动相B（%）
0~5	5	95
5~20	5→10	95→90
20~40	10→24	90→76

40~55

24→32

76→68

55~75

32→42


68→58

参照物溶液的制备 取川楝子对照药材 1g，置具塞锥形瓶中，加水 50ml，加热回流 60 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加 70% 甲醇 50ml，超声处理（功率 300W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，离心（4000 转/分钟）10 分钟，取上清液 25ml，蒸干，残渣加 70% 甲醇溶解，并转移至 2ml 量瓶中，加 70% 甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取川楝素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取 0.3g，置具塞锥形瓶中，加 70% 甲醇 50ml，自“超声处理（功率 300W，频率 40kHz）30 分钟”起，按对照药材参照物溶液的制备方法同法制备，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现 6 个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的 6 个特征峰保留时间相对应，其中峰 5、峰 6 应分别与川楝素对照品参照物峰保留时间相对应；以峰 5 为 S 峰，计算各特征峰与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 范围之内。规定值为：0.42（峰 1）、0.48（峰 2）、0.57（峰 3）、0.90（峰 4）。



对照特征图谱

峰 5（S）：川楝素（异构体 1） 峰 6：川楝素（异构体 2）

色谱柱：Agilent 5TC-C18(2)，4.6mm \times 250mm，5 μ m

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 年版通则 0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 14.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.01% 甲酸溶液（31:69）为流动相；流速为每分钟 1.0ml；柱温为 30℃；蒸发光散射检测器检测。理论板数按川楝素峰计算应不低于 5000。

对照品溶液的制备 取川楝素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约 1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 300W，频率 40kHz）30 分钟，取出，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，离心（4000 转/分钟）10 分钟，精密量取上清液 25ml，蒸干，残渣加甲醇溶解，并转移至 2ml 量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10μl、20μl，供试品溶液 10μl~20μl，注入液相色谱仪，测定，以外标两点法对数方程计算，以川楝素两个峰面积之和计算，即得。

本品每 1g 含川楝素（ $C_{30}H_{38}O_{11}$ ）应为 0.35mg~1.25mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.4g

【贮藏】 密封。